


تعداد صفحه: ۲	ساعت شروع: ۸ صبح	تاریخ امتحان: ۱۳۹۸/۰۶/۰۹	سوالات امتحان نهایی درس: حسابان ۲
مدت امتحان: ۱۳۰ دقیقه	رشته: ریاضی و فیزیک	نام و نام خانوادگی:	پایه دوازدهم دوره دوم متوسطه
دانش آموزان روزانه، بزرگسال و داوطلبان آزاد سراسر کشور در نوبت شهربور ماه سال ۱۳۹۸ http://aee.medu.ir			

ردیف	سؤالات (پاسخ نامه دارد)	نمره
۱	<p>کوتاه پاسخ دهید.</p> <p>(الف) درجه تابع $f(x) = x^5(1-x)^5$ را مشخص کنید.</p> <p>(ب) در فاصله $[1, 5]$ از بین دو تابع $f(x) = x^3$ و $g(x) = x^5$ ، نمودار کدام تابع پایین تر قرار دارد؟</p> <p>(پ) نمودار تابع $y = f(x)$ ، قرینه نمودار تابع $y = f(x)$ نسبت به کدام محور است؟</p> <p>(ت) تابع $h(x) = x+2$ در چه بازه‌ای اکیداً صعودی است؟</p>	۱
۲	<p>نمودار تابع f در شکل زیر رسم شده است. نمودار تابع $g(x) = f(3-x)$ را رسم کرده و دامنه آن را تعیین کنید.</p>	۱
۳	<p>مقادیر a و b را طوری تعیین کنید که چند جمله‌ای $P(x) = x^5 + ax^3 + bx + 1$ بر $(x-2)$ و $(x+1)$ بخش پذیر باشد.</p>	۱
۴	<p>اگر $\log(x+1) \leq \log(2x-3)$ ، حدود x را به دست آورید.</p>	۰/۵
۵	<p>دوره تناوب، مقادیر ماکزیمم و مینیمم تابع $y = -3\cos(\pi x) + 1$ را مشخص کنید.</p>	۱/۵
۶	<p>کدام یک از جملات زیر درست و کدام یک نادرست است؟</p> <p>(الف) تابع تانژانت در بازه $(-\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2})$ اکیداً صعودی است.</p> <p>(ب) نقاطی به فرم $x = k\pi + \frac{\pi}{2}$ ، $(k \in \mathbb{Z})$ در دامنه تابع تانژانت قرار دارند.</p>	۰/۵
۷	<p>معادله مثلثاتی $\sin 2x = \sin 3x$ را حل کنید.</p>	۱
۸	<p>با توجه به نمودار تابع f که در شکل زیر آورده شده است، به سوالات پاسخ دهید.</p> <p style="text-align: center;">الف) $\lim_{x \rightarrow (-2)^-} f(x)$ ب) $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$</p>	۰/۵
۹	<p>حدهای زیر را محاسبه کنید.</p> <p>(الف) $\lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{x^3 - 1}{(x-1)^2}$</p> <p>(ب) $\lim_{x \rightarrow -\infty} (-2x^3 + x - 1)$</p> <p>(پ) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^3 + 1}{2x^3 - 4x}$</p>	۱/۷۵

تعداد صفحه: ۲	ساعت شروع: ۸ صبح	تاریخ امتحان: ۱۳۹۸/۰۶/۰۹	سوالات امتحان نهایی درس: حسابان ۲
مدت امتحان: ۱۳۰ دقیقه	رشته: ریاضی و فیزیک	نام و نام خانوادگی:	پایه دوازدهم دوره دوم متوسطه
دانش آموزان روزانه، بزرگسال و داوطلبان آزاد سراسر کشور در نوبت شهربور ماه سال ۱۳۹۸ http://aee.medu.ir			

ردیف	سؤالات (پاسخ نامه دارد)	نمره
۱۰	مجانب های قائم و افقی نمودار تابع $y = \frac{x+3}{2-x}$ را بنویسید.	۰/۷۵
۱۱	با توجه به نمودار داده شده، گزینه مناسب را انتخاب کنید. (i) در کدام نقطه مماس افقی بر نمودار رسم می شود? (ii) شیب خط مماس در نقطه F چه علامتی دارد? (iii) شیب خط مماس بر نمودار، در نقطه D نسبت به نقطه B چگونه است? (الف) مثبت (ب) منفی (الف) بیشتر (ب) کمتر	۰/۷۵
۱۲	مشتق پذیری تابع $ x^3 - 4 $ را در $x=2$ بررسی کنید.	۲
۱۳	مشتق توابع زیر را به دست آورید. (الف) $f(x) = (2x^3 + \sqrt[3]{x} - 1)^4$ (ب) $g(x) = \cos\left(\frac{x}{x^2 + 1}\right)$	۲/۲۵
۱۴	آهنگ تغییر لحظه‌ای تابع $f(x) = 2x^3 + 5x + 1$ در نقطه $x=2$ چند برابر آهنگ تغییر لحظه‌ای آن در $x=-1$ است؟	۱
۱۵	مقادیر اکسٹرمم های نسبی و مطلق تابع $f(x) = \frac{1}{3}x^3 + x^2 - 2x - 3$ را در بازه $[2, 3]$ به دست آورید.	۱/۷۵
۱۶	ابتدا جهت تکرار تابع $y = \frac{x+1}{x-1}$ را مشخص کرده، سپس وجود نقطه عطف آن را بررسی کنید.	۱/۵
۱۷	جدول رفتار و نمودار تابع $y = x^3 + 3x^2 + 1$ را رسم کنید.	۱/۲۵
۲۰	موفق و سر بلند باشد.	جمع نمره



مدت امتحان: ۱۳۰ دقیقه	ساعت شروع: ۸ صبح	رشته: ریاضی و فیزیک	راهنمای تصحیح امتحان نهایی درس: حسابان ۲
تاریخ امتحان: ۱۳۹۸/۰۶/۰۹			پایه دوازدهم دوره دوم متوسطه
دانش آموزان روزانه، بزرگسال و داوطلبان آزاد سراسرکشودر شهریور ماه سال ۱۳۹۸ مرکز سنجش و پایش کیفیت آموزشی http://aee.medu.ir			

ردیف	راهنمای تصحیح	نمره
۱	الف) ۷ (۰/۲۵) (کار در کلاس صفحه ۱۱) پ) محور طول ها (۰/۲۵) (نکته صفحه ۷)	۱ ۱
۲	(تمرین ۲، قسمت ث، صفحه ۱۲) $D_g = [-2, 2] \quad (0/5)$	۱
۳	$\lambda + 4a + 2b + 1 = 0 \Rightarrow 4a + 2b = -\lambda - 1 \quad (0/25)$ $-1 + a - b + 1 = 0 \Rightarrow a - b = 0 \quad (0/25)$ $a = -\frac{\lambda}{2} \quad (0/25)$ $b = \frac{\lambda}{2} \quad (0/25)$ (تمرین ۷ صفحه ۲۲)	۱
۴	(قسمت ۴ کار در کلاس صفحه ۱۸) $x + 1 \leq 2x - 3 \quad (0/25) \Rightarrow x \geq 4 \quad (0/25)$	۰/۵
۵	(مشابه مثال صفحه ۲۷) $T = \frac{2\pi}{\pi} = 2 \quad (0/5)$, $\max = -3 + 1 = 4 \quad (0/5)$, $\min = - -3 + 1 = -2 \quad (0/5)$	۱/۵
۶	الف) درست (۰/۲۵) (قسمت پ کار در کلاس صفحه ۳۱) ب) نادرست (۰/۰) (نکته بالای صفحه ۳۲)	۰/۵
۷	$3x = 2k\pi + 2x \quad (0/25) \Rightarrow x = 2k\pi \quad (k \in \mathbb{Z}) \quad (0/25)$ $3x = (2k+1)\pi - 2x \quad (0/25) \Rightarrow x = \frac{(2k+1)\pi}{5} \quad (k \in \mathbb{Z}) \quad (0/25)$ (مثال دوم صفحه ۳۹)	۱
۸	الف) $+\infty \quad (0/25)$ ب) ۱ (۰/۰) (مشابه کار در کلاس صفحه ۵۰)	۰/۵
۹	(قسمت پ کار در کلاس صفحه ۵۳) الف) $\lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{(x-1)(x+1)}{(x-1)^2} = \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{x+1}{x-1} = +\infty \quad (0/25)$ ب) $\lim_{x \rightarrow -\infty} x^r \left(-2 + \frac{1}{x^r} - \frac{1}{x^r} \right) = \lim_{x \rightarrow -\infty} (-2x^r) = +\infty \quad (0/25)$ (قسمت الف مثال صفحه ۶۵) پ) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^r}{2x^r} = \frac{1}{2} \quad (0/25)$ (مشابه تمرین ۳ صفحه ۶۹)	۱/۲۵
۱۰	م. قائم: $x = 2 \quad (0/25)$ م. افقی: $y = -1 \quad (0/25)$ (مشابه تمرین ۴ صفحه ۶۹)	۰/۷۵
۱۱	الف (۰/۲۵) (ii) ب (۰/۰) (E) (۰/۲۵) (i) ب (۰/۲۵) (iii) ب (کمتر) (۰/۲۵) (ii) ب (۰/۲۵) (مشابه تمرین ۲ و ۳ صفحه ۸۱)	۰/۷۵
۱۲	(مشابه مثال صفحه ۸۶) $f'_+(2) = \lim_{x \rightarrow 2^+} \frac{f(x) - f(2)}{x - 2} \stackrel{(0/25)}{=} \lim_{x \rightarrow 2^+} \frac{ x^r - 4 - 0}{x - 2} = \underbrace{\lim_{x \rightarrow 2^+} \frac{x^r - 4}{x - 2}}_{(0/25)} = \underbrace{\lim_{x \rightarrow 2^+} \frac{(x-2)(x+2)}{x-2}}_{(0/25)} = 4 \quad (0/25)$	۲

«ادامه پاسخ ها در صفحه دوم»

مدت امتحان: ۱۳۰ دقیقه	ساعت شروع: ۸ صبح	رشته: ریاضی و فیزیک	راهنمای تصحیح امتحان نهایی درس: حسابان ۲
تاریخ امتحان: ۱۳۹۸/۰۶/۰۹			پایه دوازدهم دوره دوم متوسطه
دانش آموزان روزانه، بزرگسال و داوطلبان آزاد سراسرکشودر شهریور ماه سال ۱۳۹۸ مرکز سنجش و پایش کیفیت آموزشی http://aee.medu.ir			

ردیف	راهنمای تصحیح	نمره
۱۲	$f'_-(2) = \lim_{x \rightarrow 2^-} \frac{-(x^r - 4)}{x - 2} \quad (0/25) = \lim_{x \rightarrow 2^-} \frac{-(x-2)(x+2)}{x-2} = -4 \quad (0/25) \Rightarrow f'_-(2) \neq f'_+(2) \quad (0/25)$ تابع در این نقطه مشتق پذیر نیست. $(0/25)$	ادامه
۱۳	$f'(x) = \frac{4}{(x^r + 1)^{\frac{1}{r}}} \quad (0/25) \quad (الف)$ $g'(x) = -\sin\left(\frac{x}{x^r + 1}\right) \quad (0/5) \times \frac{(0/25)(x^r + 1) - 2x^r \quad (0/25)}{(x^r + 1)^2 \quad (0/25)}$	۲/۲۵
۱۴	$f'(x) = 4x + 5 \quad (0/25) \Rightarrow f'(-1) = 1 \quad (0/25)$ $f'(2) = 13 \quad (0/25)$ (آهنگ متوسط و لحظه‌ای تغییر از صفحه ۱۰۲ تا صفحه ۱۱۰) برابر $(0/25)$. زیرا:	۱
۱۵	$f'(x) = x^r + rx \quad \xrightarrow{f'=\infty} x = 0, x = -2 \Rightarrow f(-2) = \frac{4}{3} \quad (0/25), f(0) = 0 \quad (0/25)$ $f(3) = 18 \quad (0/25)$ مینیمم مطلق ماکزیمم مطلق $\begin{array}{c ccccc} x & -2 & 0 \\ \hline f' & + & 0 & - & 0 & + \\ f & \nearrow \frac{4}{3} & \searrow 0 & \nearrow & & \end{array} \quad (0/25) \quad f(0) = 0 \quad \text{مینیمم نسبی}$ (مشابه مثال صفحه ۱۲۳)	۱/۷۵
۱۶	$y' = \frac{-2}{(x-1)^2} \quad (0/25), y'' = \frac{4}{(x-1)^3} \quad (0/25)$ $x-1 = 0 \Rightarrow x = 1$ در بازه $(1, +\infty)$ تقریر رو به بالا $(0/25)$ در بازه $(-\infty, 1)$ تقریر رو به پایین $(0/25)$ قسمت ب تمرین ۲ صفحه ۱۳۶	۱/۵
۱۷	$y' = 3x^2 + 6x \quad (0/25) \xrightarrow{y'=0} x = 0, x = -2$ $\begin{array}{c ccccc} x & -\infty & -2 & 0 & +\infty \\ \hline f' & + & 0 & - & 0 & + \\ f & -\infty & \nearrow 5 & \searrow 1 & \nearrow +\infty & \end{array} \quad (0/5)$ ماکزیمم مینیمم (مشابه قسمت ب تمرین ۱ صفحه ۱۴۴)	۱/۲۵

" درنهایت، نظر همکاران محترم صائب است "

