

با اسمه تعالی

سؤالات امتحان نهایی درس : ریاضی ۳	رشته : علوم تجربی	ساعت شروع: ۸ صبح	تعداد صفحه: ۳
پایه دوازدهم دوره دوم متوسطه	نام و نام خانوادگی :	تاریخ امتحان: ۱۴۰۰/۰۶/۲۷	مدت امتحان: ۱۲۰:
دانش آموزان روزانه، بزرگسال و داوطلبان آزاد در فوبت شهریور ماه سال ۱۴۰۰			مرکز سنجش و پایش کیفیت آموزشی
ردیف	رده سؤالات (پاسخ نامه دارد) (استفاده از ماشین حساب ساده مجاز می باشد)		ردیف

۱	درستی یا نادرستی عبارت های زیر را مشخص کنید. الف) دامنه توابع چند جمله ای برابر $\mathbb{R}$ است. ب) دو تابع با ضابطه های $f(x) = x^3 - 2x + 1$ و $g(x) = \sqrt[3]{x}$ وارون یکدیگرند. پ) تابع با ضابطه $f(x) = \sqrt{x}$ در دامنه اش اکیداً نزولی است.	۰/۷۵															
۲	نمودار تابع با ضابطه $y = x^3 - 2x + 1$ را ابتدا دو واحد به سمت پایین سپس یک واحد به سمت چپ و در مرحله ای آخر نسبت به محور $x$ ها قرینه می کنیم . ضابطه $y$ نمودار تابع را در هر مرحله بنویسید.	۰/۷۵															
۳	با توجه به جدول زیر، مقادیر خواسته شده را به دست آورید. (الف) $(g \circ f)(1)$ (ب) $(f \circ (f + g))(0)$	۱/۵															
	<table border="1"> <tr> <td><math>x</math></td><td>-1</td><td>0</td><td>1</td><td>2</td></tr> <tr> <td><math>f(x)</math></td><td>0</td><td>-1</td><td>2</td><td>-5</td></tr> <tr> <td><math>g(x)</math></td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>-2</td></tr> </table>	$x$	-1	0	1	2	$f(x)$	0	-1	2	-5	$g(x)$	2	3	4	-2	
$x$	-1	0	1	2													
$f(x)$	0	-1	2	-5													
$g(x)$	2	3	4	-2													
۴	معادله ی یک تابع سینوسی $y = a \sin(bx + c)$ را بنویسید که مقدار ماکزیمم آن ۵ و مقدار مینیمم آن $-1$ و دوره ای تناوب آن $8\pi$ است.	۱															
۵	مثلثی با مساحت $8\sqrt{2}$ سانتی متر مربع مفروض است. اگر اندازه ای دو ضلع این مثلث به ترتیب ۴ و ۸ سانتی متر باشند، آن گاه چند مثلث با این خصیت ها می توان ساخت؟	۱															
۶	حاصل عبارت $4 \sin x \cos x \cos 2x = 7$ را به ازای $x = 5^\circ$ محاسبه نمایید.	۱															
«ادامه سوالات در صفحه دوم»																	

با سمه تعالی

سؤالات امتحان نهایی درس: ریاضی ۳	رشته: علوم تجربی	ساعت شروع: ۸ صبح	تعداد صفحه: ۳
پایه دوازدهم دوره دوم متوسطه	نام و نام خانوادگی:	تاریخ امتحان: ۱۴۰۰/۰۶/۲۷	مدت امتحان: ۱۲۰:
دانش آموزان روزانه، بزرگسال و داوطلبان آزاد در فوبت شهریور ماه سال ۱۴۰۰			مرکز سنجش و پایش کیفیت آموزشی
ردیف	رده سؤالات (پاسخ نامه دارد) (استفاده از ماشین حساب ساده مجاز می باشد)		ردیف

۲	<p>حد توابع زیر را در صورت وجود محاسبه کنید.</p> <p>(الف) <math>\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x - \sqrt{x}}{x^2 + x - 2}</math></p> <p>(ب) <math>\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}^+} \tan x</math></p> <p>(پ) <math>\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{-4x^3 + 5x^2}{2x^3 + 9}</math></p>	۷										
۱	<p>با در نظر گرفتن نمودار تابع <math>f</math> در شکل زیر، نقاط به طول های <math>a, b, c</math> و <math>d</math> را با مشتق های داده در جدول نظیر کنید.</p> <table border="1"> <tr> <td><math>x</math></td> <td><math>f'(x)</math></td> </tr> <tr> <td></td> <td>•</td> </tr> <tr> <td></td> <td>+0/۵</td> </tr> <tr> <td></td> <td>۲</td> </tr> <tr> <td></td> <td>-0/۵</td> </tr> </table>	$x$	$f'(x)$		•		+0/۵		۲		-0/۵	۸
$x$	$f'(x)$											
	•											
	+0/۵											
	۲											
	-0/۵											
۱	<p>مشتق تابع های زیر را به دست آورید. (ساده کردن مشتق الزامی نیست)</p> <p>(الف) <math>f(x) = (x^2 + 2x + 1)^5</math></p> <p>(ب) <math>g(x) = \frac{x}{\sqrt{3x + 2}}</math></p> <p><math>f(x) = \begin{cases} x^2 &amp; x &lt; 0 \\ x &amp; x \geq 0 \end{cases}</math> اگر <math>f'_+(0) = f'_-(0) = f'(0)</math> موجودند ولی <math>f'(0)</math> موجود نیست.</p>	۹										
۱/۵	<p>تابع با ضابطه <math>y = 7\sqrt{x} + 50</math> متوسط قد کودکان تا شصت ماهگی را نشان می دهد که در آن <math>x</math> مدت زمان پس از تولد (برحسب ماه) است.</p> <p>(الف) آهنگ تغییر متوسط رشد در بازه <math>[0, 25]</math> چقدر است؟</p> <p>(ب) آهنگ لحظه ای تغییر قد در <math>49</math> ماهگی چقدر است؟</p>	۱۰										
۱/۵	<p>تابع با ضابطه <math>y = x^3 - 3x</math> در چه بازه هایی اکیدا صعودی و در کدام بازه اکیدا نزولی است؟</p>	۱۱										
۱/۵	<p>دو عدد حقیقی بیابید که تفاضل آنها <math>10</math> باشد و حاصل ضربشان کمترین مقدار ممکن گردد.</p>	۱۲										
«ادامه سوالات در صفحه سوم»												

با اسمه تعالی

سؤالات امتحان نهایی درس : ریاضی ۳	رشته : علوم تجربی	ساعت شروع: ۸ صبح	تعداد صفحه: ۳
پایه دوازدهم دوره دوم متوسطه	نام و نام خانوادگی :	تاریخ امتحان: ۱۴۰۰/۰۶/۲۷	مدت امتحان: ۱۲۰:
دانش آموزان روزانه، بزرگسال و داوطلبان آزاد در فوبت شهریور ماه سال ۱۴۰۰			مرکز سنجش و پایش کیفیت آموزشی
ردیف	سؤالات (پاسخ نامه دارد) (استفاده از ماشین حساب ساده مجاز می باشد)		ردیف

۱	در یک بیضی افقی، طول قطر بزرگ ۶ و قطر کوچک ۴ واحد است. اگر مرکز این بیضی نقطه‌ای با مختصات (۴,۵) باشد: الف) فاصله کانونی بیضی را پیدا کنید. ب) مختصات نقاط دو سر قطر بزرگ را بنویسید.	۱۴
۱/۵	وضعیت خط $3 = y + x$ و دایره $0 = -y^2 + x^2 - 2x - 3$ را نسبت به هم مشخص کنید.	۱۵
۱/۵	دو ظرف یکسان داریم. ظرف اول شامل ۶ مهره سبز و ۴ مهره آبی و ظرف دوم شامل ۵ مهره سبز و ۷ مهره آبی است. از ظرف اول مهره‌ای انتخاب کرده و در ظرف دوم قرار می دهیم. سپس یک مهره به تصادف از ظرف دوم انتخاب می کنیم. به چه احتمالی این مهره سبز است؟	۱۶
۲۰	جمع نمره "موفق باشید"	

مدت امتحان: ۱۲۰ دقیقه	ساعت شروع: ۸ صبح	رشته: علوم تجربی ۳
تاریخ امتحان: ۱۴۰۰/۰۶/۲۷		پایه دوازدهم دوره دوم متوسطه
مرکز سنجش و پایش کیفیت آموزشی		دانش آموزان روزانه، بزرگسال و داوطلبان آزاد در نوبت شریور ماه سال ۱۴۰۰

ردیف	ردیفه	راهنمای تصحیح	نمره
۱		(الف) درست صفحات: ۲۶ و ۲۷ پ) نادرست	۰/۷۵ هر مورد ۰/۲۵
۲		صفحه: ۲۳	۰/۷۵ مرحله ۱ مرحله ۲ مرحله ۳ $f(x)-2=(x-1)^3-2 \quad (0/25)$ $f(x+1)-2=x^3-2 \quad (0/25)$ $-f(x+1)+2=-x^3+2 \quad (0/25)$
۳		صفحه: ۲۳	۰/۵ الف $g(f(1))=g(2)=-2 \quad (0/5)$ ۱ ب) $\underbrace{(f+g)(\cdot)}_{(0/5)} = -1 + 3 = 2 \Rightarrow \underbrace{(f((f+g)(\cdot)))}_{(0/5)} = f(2) = -5$
۴		صفحه: ۴۱	۱ $ a  = \frac{\Delta - (-1)}{2} = 3 \Rightarrow a = \pm 3 \quad , \quad c = \frac{\Delta + (-1)}{2} = 2 \quad (0/25)$ $ b  = \frac{2\pi}{8\pi} = \frac{1}{4} \Rightarrow b = \pm \frac{1}{4} \quad (0/25) \quad y = \pm 3 \sin(\pm \frac{1}{4}x) + 2 \quad (0/25)$ نوشتن یک معادله سینوسی نمره کامل تعلق گیرد.
۵		صفحه: ۴۷	۱ $\underbrace{\frac{1}{2} \times 4 \times 8 \sin \theta = 8\sqrt{2}}_{(0/25)} \Rightarrow \sin \theta = \frac{\sqrt{2}}{2} \Rightarrow \theta = 45^\circ, \theta = 135^\circ \quad (0/5)$ دو مثلث میتوان رسم کرد (۰/۲۵)
۶		صفحه: ۴۳	۱ $2 \sin 2x \cos 2x \quad (0/25) = \underbrace{\sin 4x}_{(0/25)} = \underbrace{\sin 4(45^\circ)}_{(0/25)} = \frac{1}{2} \quad (0/25)$
۷			۰/۷۵ (الف) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x-\sqrt{x})(x+\sqrt{x})}{(x-1)(x+2)(x+\sqrt{x})} \quad (0/25) = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x(x-1)}{(x-1)(x+2)(x+\sqrt{x})} \quad (0/25) = \frac{1}{6} \quad (0/25)$

مدت امتحان: ۱۲۰ دقیقه	ساعت شروع: ۸ صبح	رشته: علوم تجربی ۳
تاریخ امتحان: ۱۴۰۰/۰۶/۲۷		پایه دوازدهم دوره دوم متوسطه
مرکز سنجش و پایش کیفیت آموزشی	دانش آموزان روزانه، بزرگسال و داوطلبان آزاد در نوبت شریور ماه سال ۱۴۰۰	

ردیف	راهنمای تصحیح	نمره										
	<p>۰/۵      ب) <math>\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}^+} \frac{\sin x}{\cos x} = \frac{1}{0^-} = -\infty \quad (0/25)</math></p> <p>۰/۷۵      ب) <math>\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x^v(-4 + \frac{\Delta}{x^v})}{x^v(2 + \frac{\Delta}{x^v})} = \lim_{x \rightarrow -\infty} (-2)x^v = -\infty \quad (0/25)</math></p>											
	صفحات: ۵۲ و ۵۷ و ۶۴											
۸	<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td><math>x</math></td><td>a</td><td>b</td><td>c</td><td>d</td></tr> <tr> <td><math>f'(x)</math></td><td>- ۰/۵</td><td>۰/۵</td><td>۲</td><td>.</td></tr> </table> <p>هرمورد (۰/۲۵) صفحه: ۷۵</p>	$x$	a	b	c	d	$f'(x)$	- ۰/۵	۰/۵	۲	.	۱
$x$	a	b	c	d								
$f'(x)$	- ۰/۵	۰/۵	۲	.								
۹	<p>تابع در <math>x=0</math> پیوسته است. (۰/۲۵)</p> <p><math>f'_+(0) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x-0}{x-0} = 1 \quad (0/25)</math></p> <p><math>f'_-(0) = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{x^v-0}{x-0} = 0 \quad (0/25)</math></p> <p>۹۰: <math>f'_+(0) \neq f'_-(0)</math> پس مشتق تابع در <math>x=0</math> موجود نیست.</p>	۱										
۱۰	<p>الف) <math>f'(x) = ۵ \underbrace{(x^v + 2x + 1)^v}_{(0/25)} \underbrace{(2x + 2)}_{(0/25)}</math></p> <p>۰/۷۵      ب) <math>g'(x) = \frac{(1)(\sqrt{3x+2}) - \frac{3x}{2\sqrt{3x+2}}}{(\sqrt{3x+2})^v} \quad (0/25)</math></p>	۰/۷۵										
	صفحات: ۹۲											
۱۱	<p>الف) <math>\frac{\Delta f}{\Delta x} = \frac{f(25)-f(0)}{25-0} = \frac{85-50}{25} = \frac{7}{5} \quad (0/25)</math></p> <p>۰/۷۵      ب) <math>f'(49) = \frac{7}{2\sqrt{49}} = \frac{7}{2\sqrt{49}} = \frac{1}{2} \quad (0/25)</math></p> <p>صفحه: ۹۸</p>	۰/۷۵										

مدت امتحان: ۱۲۰ دقیقه	ساعت شروع: ۸ صبح	رشته: علوم تجربی ۳
تاریخ امتحان: ۱۴۰۰/۰۶/۲۷		پایه دوازدهم دوره دوم متوسطه
مرکز سنجش و پایش کیفیت آموزشی	دانش آموزان روزانه، بزرگسال و داوطلبان آزاد در نوبت شریور ماه سال ۱۴۰۰	

ردیف	راهنمای تصحیح	نمره
۱۲	$f'(x) = \cdot \Rightarrow 3x^2 - 3 = \cdot \Rightarrow x = \pm 1 \quad (\cdot / 5)$ تکمیل جدول (۰/۲۵) صفحه: ۱۱۲	۱/۵
۱۳	$y = ۱ + x \quad (\cdot / ۲۵) \rightarrow p = (y)(x) = ۱ \cdot x + x^2 \quad (\cdot / ۲۵) \rightarrow p'(x) = ۱ + ۲x = \cdot$ $\rightarrow x = -\frac{۱}{۲} \quad (\cdot / ۲۵), y = +\frac{۱}{۴} \quad (\cdot / ۲۵)$ صفحه: ۱۱۴	۱/۵
۱۴	$c^2 = a^2 - b^2 = ۹ - ۴ = ۵ \rightarrow c = \sqrt{۵} \quad (\cdot / ۲۵) \Rightarrow FF' = ۲\sqrt{۵} \quad (\cdot / ۲۵)$ الف) $A(۴+۳, ۵) \quad (\cdot / ۲۵) \quad , \quad A'(۴-۳, ۵) \quad (\cdot / ۲۵)$ ب) صفحه: ۱۳۲	۰/۵
۱۵	$R = \frac{۱}{۲}\sqrt{۴+۰+۱۲} = ۲ \quad , \quad O(۱, ۰) \quad (\cdot / ۵)$ $OH = \frac{ ۱ \times ۱ + ۰ \times ۱ - ۳ }{\sqrt{۱^2 + ۱^2}} = \sqrt{۲} \quad (\cdot / ۵) \quad \Rightarrow \quad OH < R \quad (\cdot / ۲۵)$ خط و دایره متقاطع اند. (۰/۲۵) صفحه: ۱۳۹	۱/۵
۱۶	$P(A) = P(G)P(A G) + P(B)P(A B) \quad (\cdot / ۲۵)$ $P(A) = \underbrace{\frac{۶}{۱۰}}_{(\cdot / ۵)} \times \underbrace{\frac{۶}{۱۳}}_{(\cdot / ۵)} + \underbrace{\frac{۴}{۱۰}}_{(\cdot / ۵)} \times \underbrace{\frac{۵}{۱۳}}_{(\cdot / ۵)} = \frac{۵۶}{۱۳۰} \quad (\cdot / ۲۵)$ اگر از راه نمودار درختی حل شود، نمره کامل تعلق گیرد. صفحه: ۱۴۸	۱/۵
	"درنهایت، نظر همکاران محترم صائب است"	۲۰