

باسم‌هه تعالی



ساعت شروع: ۱۰ صبح	تاریخ امتحان: ۱۳۹۸/۱۰/۲۱	نام و نام خانوادگی: هندسه ۳	سوالات امتحان نهایی درس: هندسه ۳
تعداد صفحه: ۲	مدت امتحان: ۱۳۵ دقیقه	پایه: دوازدهم دوره دوم متوسطه	رشته: ریاضی فیزیک
دانش آموزان روزانه، بزرگسال و داوطلبان آزاد سراسر کشور در نوبت دی ماه سال ۱۳۹۸			دانش آموزان روزانه، بزرگسال و داوطلبان آزاد سراسر کشور در نوبت دی ماه سال ۱۳۹۸
مرکز سنجش و پایش کیفیت آموزشی <a href="http://aee.medu.ir">http://aee.medu.ir</a>			http://aee.medu.ir

ردیف	ردیف	سوالات (پاسخ نامه دارد)	ردیف
		استفاده از ماشین حساب ساده (دارای چهار عمل اصلی) مجاز است.	

۱	+۷۵	<p>جاهای خالی را با عبارات مناسب پر کنید.</p> <p>الف) در ماتریس <math>A = \begin{bmatrix} a_{ij} \end{bmatrix}_{4 \times 3}</math> که در آن <math>a_{ij} = \frac{2i}{j-1}</math> باشد، درایه واقع در سطر سوم و ستون دوم ماتریس <math>A</math> برابر است با: ..... .</p> <p>ب) اگر <math>A = \begin{bmatrix} -2 &amp; 0 &amp; 0 \\ -1 &amp; 4 &amp; 0 \\ 0 &amp; 1 &amp; -1 \end{bmatrix}</math> باشد، مقدار <math> A </math> برابر است با ..... .</p> <p>پ) اگر <math>\vec{i}, \vec{j}</math> و <math>\vec{k}</math> بردارهای یکه در فضای <math>\mathbb{R}^3</math> باشند، حاصل <math>(\vec{i} \times \vec{j}) \cdot \vec{k}</math> برابر است با ..... .</p>	
۲	۱	<p>درستی و نادرستی عبارات زیر را مشخص کنید.</p> <p>الف) هر ماتریس اسکالار یک ماتریس قطری است.</p> <p>ب) معادله ضمنی <math>x^2 + y^2 + ax + by + c = 0</math> معادله یک دایره است اگر و تنها اگر <math>a^2 + b^2 &lt; 4c</math> باشد.</p> <p>پ) در حالتی که خروج از مرکز بیضی برابر یک باشد بیضی تبدیل به یک پاره خط می‌شود.</p> <p>ت) اگر برای دو بردار غیر صفر <math>\vec{a}</math> و <math>\vec{b}</math> داشته باشیم: <math>\theta = \arccos \frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{\ \vec{a}\  \ \vec{b}\ }</math> زاویه بین دو بردار <math>\vec{a}</math> و <math>\vec{b}</math> است.</p>	
۳	۱/۲۵	<p>اگر <math>B = \begin{bmatrix} 1 &amp; -1 \\ 0 &amp; 1 \\ 2 &amp; 3 \end{bmatrix}</math> باشد، دترمینان ماتریس <math>BA</math> را به دست آورید.</p>	
۴	۱/۵	<p>اگر <math>A = \begin{bmatrix} 0 &amp; 2 \\ -1 &amp; 0 \end{bmatrix}</math> باشد، ماتریس <math>A^7</math> را به دست آورید.</p>	
۵	۱/۲۵	<p>اگر ماتریس‌های <math>A = \begin{bmatrix} 1 &amp; 0 &amp; 2 \\ 0 &amp; -1 &amp; 1 \\ 2 &amp; 1 &amp; 0 \end{bmatrix}</math> و <math>B = \begin{bmatrix} a+b &amp; 2 &amp; 2 \\ 2 &amp; 2 &amp; -1 \\ 2 &amp; -1 &amp; 4a+b \end{bmatrix}</math> باشند، مقادیر <math>a</math> و <math>b</math> را چنان باید</p> <p>که داشته باشیم: <math>A^7 - B = \bar{O}</math> (ماتریس صفر است)</p>	
۶	۱/۲۵	<p>جواب دستگاه زیر را در صورت وجود، با استفاده از ماتریس وارون بایابد.</p> $\begin{cases} 3x - 5y = -1 \\ 2x + y = \lambda \end{cases}$	
		«ادامه سوالات در صفحه دوم»	

باسم‌هه تعالی

ساعت شروع: ۱۰ صبح	تاریخ امتحان: ۱۳۹۸/۱۰/۲۱	نام و نام خانوادگی: هندسه ۳
تعداد صفحه: ۲	مدت امتحان: ۱۳۵ دقیقه	پایه: دوازدهم دوره دوم متوسطه
دانش آموزان روزانه، بزرگسال و داوطلبان آزاد سراسر کشور در نوبت دی ماه سال ۱۳۹۸ <a href="http://aee.medu.ir">http://aee.medu.ir</a>		

ردیف	سؤالات (پاسخ نامه دارد)	نمره
۷	نقاط A, B و C در صفحه مفروض‌اند. نقطه‌ای بیایید که از A و B به یک فاصله و از C به فاصله ۳ سانتی‌متر باشد(بحث کنید).	۱/۵
۸	معادله دایره‌ای را بنویسید که مرکز آن O(۲, -۲) بوده و بر دایره به معادله $x^2 + y^2 + 2x - 4y = 4$ مماس خارج باشد.	۱/۵
۹	وضعیت خط $3x + y = 0$ را نسبت به دایره $x^2 + y^2 - 4x - 4y + 7 = 0$ مشخص کنید.	۱/۲۵
۱۰	نقشه M روی بیضی به اقطار ۶ و ۱۰ واحد به گونه‌ای قرار دارد که فاصله آن تا مرکز بیضی برابر ۴ واحد است. در صورتی که بدانیم مثلث MFF' قائم‌الزاویه است، طول MF را بدست آورید. 	۱/۵
۱۱	سهمی $y^2 - 4x = 4$ مفروض است. به مرکز کانون سهمی و به شعاع ۳ واحد دایره‌ای رسم می‌کنیم، معادله دایره را بنویسید و سپس مختصات نقاط برخورد دایره و سهمی را بیایید.	۱/۷۵
۱۲	وجه‌های مکعب مستطیل مشخص شده در شکل مقابل، قسمت‌هایی از صفحات به معادلات $x = 0$ , $y = 0$ , $z = 0$ , $x = 2$ , $y = 2$ , $z = 2$ هستند. الف) مختصات نقطه A را مشخص کنید. ب) معادلات مربوط به یال AD و وجه CDFG را بنویسید. 	۱/۵
۱۳	بردارهای $\vec{a} = (1, 2, 3)$ و $\vec{b} = (-2, 0, 2)$ مفروض‌اند: الف) تصویر قائم بردار $\vec{a}$ بر امتداد بردار $\vec{b}$ را بدست آورید. ب) طول بردار $2\vec{a} - \vec{b}$ را محاسبه کنید.	۱/۵
۱۴	اگر $A = (-1, 2, 0)$ و $B = (1, 0, -1)$ و $C = (0, -1, 1)$ سه رأس مثلث ABC باشند، مساحت مثلث ABC را با استفاده از ضرب خارجی بردارها بدست آورید.	۱/۵
۱۵	اگر بردار $\vec{a} \cdot \vec{a} =  \vec{a} ^2$ باشد، ثابت کنید: $\vec{a} \cdot \vec{a} = (a_1, a_2, a_3)^T$	۱
	موفق و سر بلند باشید .	۲۰ جمع نمره

مدت امتحان: ۱۳۵ دقیقه	ساعت شروع: ۱۰ صبح	رشته: ریاضی فیزیک	راهنمای تصحیح امتحان نهایی درس: هندسه ۳
تاریخ امتحان: ۱۳۹۸/۱۰/۲۱		پایه دوازدهم دوره دوم متوسطه	
مرکز سنجش و پایش کیفیت آموزشی <a href="http://aee.medu.ir">http://aee.medu.ir</a>		دانش آموزان روزانه، بزرگسال و داوطلبان آزاد سراسرکشور دی ماه سال ۱۳۹۸	

ردیف	راهنمای تصحیح	نمره
۱	(۰/۲۵) (۰/۲۵) (۰/۲۵) (۰/۲۵) (۰/۲۵)	۰/۷۵
۲	(۰/۲۵) (۰/۲۵) (۰/۲۵) (۰/۲۵) (۰/۲۵)	۱
۳	(۰/۵) $BA = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \\ 2 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & 4 & 1 \\ -1 & 3 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 & 1 & -1 \\ -1 & 3 & 2 \\ 1 & 17 & 8 \end{bmatrix}$ $ BA  = \underbrace{3(-10) - 1(-10) - 1(-20)}_{(۰/۵)} = 0 \quad (۰/۲۵)$	۱/۲۵
۴	(۰/۲۵) $A^r = \begin{bmatrix} 0 & 2 \\ -1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 2 \\ -1 & 0 \end{bmatrix} = \underbrace{\begin{bmatrix} -2 & 0 \\ 0 & -2 \end{bmatrix}}_{(۰/۵)} = -2I \quad (۰/۲۵)$ $A^v = \underbrace{(A^r)^r}_{(۰/۲۵)} . A = \underbrace{(-2I)^r}_{(۰/۲۵)} . A = \underbrace{-A}_{(۰/۲۵)} \begin{bmatrix} 0 & 2 \\ -1 & 0 \end{bmatrix}$	۱/۵
۵	(۰/۵) $A^r = B \rightarrow \begin{bmatrix} 5 & 2 & 2 \\ 2 & 2 & -1 \\ 2 & -1 & 5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a+b & 2 & 2 \\ 2 & 2 & -1 \\ 2 & -1 & 4a+b \end{bmatrix}$ $\begin{cases} a+b=5 \\ 4a+b=5 \end{cases} \xrightarrow{(۰/۲۵)} a=0, b=5 \quad (۰/۵)$	۱/۲۵
۶	(۰/۲۵) $A = \begin{bmatrix} 3 & -5 \\ 2 & 1 \end{bmatrix} \xrightarrow{(۰/۲۵)}  A =13 \neq 0, (۰/۲۵), A^{-1} = \frac{1}{13} \begin{bmatrix} 1 & 5 \\ -2 & 3 \end{bmatrix} \quad (۰/۲۵)$ $\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \frac{1}{13} \begin{bmatrix} 1 & 5 \\ -2 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 \\ 2 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{cases} x=3 \\ y=2 \end{cases} \quad (۰/۲۵)$	۱/۲۵
	«ادامه در صفحه دوم»	

مدت امتحان: ۱۳۵ دقیقه	ساعت شروع: ۱۰ صبح	رشته: ریاضی فیزیک	راهنمای تصحیح امتحان نهایی درس: هندسه ۳
تاریخ امتحان: ۱۳۹۸/۱۰/۲۱		پایه دوازدهم دوره دوم متوسطه	
مرکز سنجش و پایش کیفیت آموزشی <a href="http://aee.medu.ir">http://aee.medu.ir</a>		دانش آموزان روزانه، بزرگسال و داوطلبان آزاد سراسرکشور دی ماه سال ۱۳۹۸	

ردیف	راهنمای تصحیح	نمره
۷	<p>مکان هندسی نقاطی که از A و B به یک فاصله اند، عمود منصف پاره خط AB (۰/۲۵) و مکان هندسی نقاطی که از نقطه C به فاصله ۳ واحد باشد، دایره‌ای به مرکز C و شعاع ۳ است، (۰/۲۵) بنابراین نقطه برخورد خط عمودمنصف(d) و دایره یکدیگر را در دو نقطه قطع کنند مسئله اگر خط عمودمنصف(d) و دایره یکدیگر را در دو نقطه قطع کنند مسئله دو جواب دارد (۰/۲۵) و اگر مماس شوند مسئله یک جواب دارد (۰/۲۵) و در صورتی که یکدیگر را قطع نکنند مسئله جواب ندارد (۰/۲۵).</p>	۱/۵
۸	$(x+1)^2 + (y-2)^2 = 9 \rightarrow O' = (-1, 2) \quad (۰/۲۵)$ $OO' = \sqrt{3^2 + 4^2} = 5 \xrightarrow{(۰/۲۵)} r + r' = 5 \xrightarrow{(۰/۲۵)} r = 2 \quad (۰/۲۵)$ $(x-2)^2 + (y+2)^2 = 4 \quad (۰/۲۵)$	۱/۵
۹	$(x-2)^2 + (y-2)^2 = 1 \rightarrow O(2, 2) \quad (۰/۲۵)$ $d = \frac{ 3(2) + 2 }{\sqrt{10}} = \frac{8}{\sqrt{10}} \xrightarrow{(۰/۵)} d > r \quad (۰/۲۵)$ <p>خط و دایره نقطه برخورد ندارند.</p>	۱/۲۵
۱۰	$c^2 = a^2 - b^2 = 25 - 9 = 16 \xrightarrow{(۰/۲۵)} c = 4 \quad (۰/۲۵)$ $MF + MF' = 2a = 10 \rightarrow MF' = 10 - MF \quad (۰/۲۵)$ $(MF)^2 + (MF')^2 = (FF')^2 \xrightarrow{(۰/۲۵)} (MF)^2 + (10 - MF)^2 = 16 \xrightarrow{(۰/۲۵)} MF = 5 \pm \sqrt{7} \quad (۰/۲۵)$	۱/۵
۱۱	$y^2 = 4(x-1) \rightarrow S(1, 0) \quad (۰/۲۵)$ $a = 1 \quad (۰/۲۵)$ $F(2, 0) \quad (۰/۲۵)$ $(x-2)^2 + y^2 = 9 \quad (۰/۲۵)$ $\begin{cases} y^2 = 4x - 4 \\ y^2 = -x^2 + 4x + 5 \end{cases} \xrightarrow{(۰/۲۵)} x = \pm 3 \quad (۰/۲۵)$ $M(3, 2\sqrt{2}) \quad , \quad M'(3, -2\sqrt{2}) \quad (۰/۲۵)$	۱/۷۵
	«ادامه در صفحه سوم»	

مدت امتحان: ۱۳۵ دقیقه	ساعت شروع: ۱۰ صبح	رشته: ریاضی فیزیک	راهنمای تصحیح امتحان نهایی درس: هندسه ۳
تاریخ امتحان: ۱۳۹۸/۱۰/۲۱		پایه دوازدهم دوره دوم متوسطه	
مرکز سنجش و پایش کیفیت آموزشی <a href="http://aee.medu.ir">http://aee.medu.ir</a>		دانش آموزان روزانه، بزرگسال و داوطلبان آزاد سراسر کشور دی ماه سال ۱۳۹۸	

ردیف	راهنمای تصحیح	نمره
۱۲	A(۰, ۴, ۳) (۰ / ۵) (ب)	۱/۵
۱۳	AD : $\begin{cases} ۰ \leq x \leq ۲ \\ y = ۴ \\ z = ۳ \end{cases}$ (۰ / ۵) CDFG : $\begin{cases} x = ۲ \\ ۰ \leq y \leq ۴ \\ ۰ \leq z \leq ۳ \end{cases}$ (۰ / ۵) (الف)	۱/۵
۱۴	$\vec{a}' = \frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{\vec{b} \cdot \vec{b}} \vec{b} = \frac{(1, 2, 3) \cdot (-2, 0, 2)}{(-2, 0, 2) \cdot (-2, 0, 2)} (-2, 0, 2) = \frac{-2 + 6}{4 + 4} (-2, 0, 2) = (-1, 0, 1)$ (۰ / ۲۵) (ب) $2\vec{a} - \vec{b} = 2(1, 2, 3) - (-2, 0, 2) = (4, 4, 4)$ (۰ / ۲۵) , $ 2\vec{a} - \vec{b}  = \sqrt{16 + 16 + 16} = \sqrt{48}$ (۰ / ۲۵)	۱/۵
۱۵	$\vec{AB} = (2, -2, -1)$ (۰ / ۲۵) , $\vec{AC} = (1, -3, 1)$ (۰ / ۲۵) $S = \frac{1}{2} \left  \vec{AB} \times \vec{AC} \right  = \frac{1}{2} \left  (-5, -3, -4) \right  = \frac{1}{2} \sqrt{25 + 9 + 16} = \frac{1}{2} \sqrt{50}$ (۰ / ۲۵)	۱/۵
۱۶	$\vec{a} \cdot \vec{a} = \underbrace{a_1 a_1 + a_2 a_2 + a_3 a_3}_{(۰ / ۵)} = \underbrace{a_1^2 + a_2^2 + a_3^2}_{(۰ / ۲۵)} =  \vec{a} ^2$ (۰ / ۲۵)	۱
	موفق و سر بلند باشید	جمع نمره
		۲۰

" مصحح گرامی ، به راه حل های درست و منطبق بر کتاب درسی بارم به تناسب منظور شود "